

Bunter Togoskink

Mabuya perottetii

Schutzstatus

nicht geschützt

Verbreitung

Afrika (Senegal bis Uganda)

Lebensraum

Savannen, trocken sowohl als auch feuchte Biotope, tagaktiv

Größe

ca. 35 cm

Lebenserwartung

über 7 Jahre

Fortpflanzung

Gelegegröße etwa 10 Eier. Inkubationsdauer bei 30 °C etwa 30-40 Tage

Temperatur

Savannen, trocken sowohl als auch feuchte Biotope, tagaktiv

Luftfeuchtigkeit

70-80%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren, gegebenenfalls UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich UV Strahler oder die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte.

Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat).

Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache Wasserschale. Bepflanzung möglich (Ficus benjamina, F. pumila Scindapsus etc.). Der Bodengrund sollte an einer Stelle immer leicht feucht sein.

Futter

Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, kleinere Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Zusätzlich Fruchtbrei oder süße Früchte. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

Literatur

HAUSCHILD, A. & P. GAßNER (1995): Skinke im Terrarium. Landbuch Verlag, 197 S.

